

إعداد الأستاذة : محمودي زكية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية برج بوعريريج
ثانوية عمار بوجلال امبارك " مجانة "
دورة : ماي 2015

وزارة التربية الوطنية
امتحان البكالوريا البيضاء للتعليم الثانوي
الشعبة : علوم تجريبية

المدة : 03 سا و 30 د

اختبار في مادة : الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (4,5 نقاط)

المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1- حل في \mathbb{C} المعادلة : $(z-1)(z^2-4z+13)=0$.

2- النقط A, B, C صور الأعداد المركبة $z_A = i, z_B = 2+3i, z_C = \bar{z}_B$.

أ- ليكن r النوران الذي مركزه النقطة B وزاويته $\frac{\pi}{4}$.

- عين z_D لاحقة النقطة D صورة النقطة A بالنوران r .

ب- برهن أن النقط B, C, D على استقامة.

ت- عين العبارة المركبة للتحاكي h ذو المركز B والتي يحول النقطة C إلى النقطة D .

التمرين الثاني: (4,5 نقاط)

النضاء منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

من أجل كل سؤال من الأسئلة التالية يوجد اقتراح واحد فقط صحيح عينه مع التبرير.

1- مجموعة النقط $M(x; y; z)$ حيث: $\begin{cases} 2x-6y+2z-7=0 \\ -x+3y-z+5=0 \end{cases}$ هي:

(أ) مجموعة خالية ، (ب) مستقيم ، (ج) نقطة واحدة ، (د) مستوي

2- المستقيمان (Δ) و (Δ') المعرفان بالتمثيلان الوسيطيان : $(\Delta): \begin{cases} x=1-t \\ y=-1+t \\ z=2-3t \end{cases}$ و $(\Delta'): \begin{cases} x=2+t \\ y=-2-t \\ z=4+2t \end{cases}$

(أ) متوازيان و غير منطبقين ، (ب) منطبقين ، (ج) متقاطعان ، (د) ليسا من نفس المستوي

3- المسافة بين النقطه $A(1;-2;1)$ و المستوي المعرف بالمعادلة $-x+3y-z+5=0$ هي :

(أ) $\frac{3}{11}$ ، (ب) $\frac{3}{\sqrt{11}}$ ، (ج) $\frac{1}{2}$ ، (د) $\frac{8}{\sqrt{11}}$

4- المسقط العمودي للنقطه $B(1;6;0)$ على المستوي ذو المعادلة $-x+3y-z+5=0$ هي النقطه H ذات الإحداثيات :

(أ) $H(3;1;5)$ ، (ب) $H(2;3;1)$ ، (ج) $H(3;0;2)$ ، (د) $H(-2;3;-6)$.


التمرين الثالث: (04 نقاط)

$$\begin{cases} u_1 = -\frac{5}{3} \\ u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2 \end{cases} \quad \text{نعتبر المتتالية العددية } (u_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N}^* \text{ بـ:}$$

- 1- أحسب u_2, u_3, u_4 و u_5 .
- 2- (أ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n أكبر من أو يساوي 5 يكون $u_n \geq n-3$.
(ب) استنتج أن المتتالية (u_n) متباعدة.
- 3- (v_n) متتالية عددية معرفة على \mathbb{N}^* بـ: $v_n = -2u_n + 3n - \frac{21}{2}$.
(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ و أحسب حدها الأول v_1 .
(ب) أحسب S_n بدلالة n حيث: $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$.
ثم استنتج T_n بدلالة n حيث: $T_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

I. دالة معرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2}$ حيث a, b و c أعداد حقيقية و (C_g) تمثيلها البياني في



مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس كما هو مبين في الشكل حيث (Δ) المستقيم المقارب للمنحنى (C_g) معادلته $y=1$
2- بقراءة بيانية:

- أ- عين $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ ثم استنتج قيمة a .
- ب- أحسب $g(1), g(3)$ ثم عين العددين b و c .
- ج- شكل جدول تغيرات الدالة g .
- 2- أدرس إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

II. f دالة معرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = -\frac{3}{x} + x - 4 \ln x$

(C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1- أ- باستخدام النتيجة $\lim_{t \rightarrow -\infty} te^t = 0$, برهن أن $\lim_{u \rightarrow 0^+} u \ln u = 0$.
ب- استنتج $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$. فسر النتيجة بيانياً.
ج- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 2- بين أنه من أجل كل x من $]0; +\infty[$: $f'(x) = g(x)$, ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .
- 3- بين أن المنحنى (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها محصورة بين 9,2 و 9,3.
- 4- بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماس (Δ') يوازي المستقيم ذو المعادلة $y=x$ و أكتب معادلة له.
- 5- تحقق أن: $f(\sqrt{3}) = -2 \ln 3$ ثم أرسم (Δ') و المنحنى (C_f) .
- 6- ناقش بيانياً و حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة $x^2 - (m+4 \ln x)x - 3 = 0$.

الموضوع الثاني

تمرين الأول: (04 نقاط)

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, نعتبر النقط $A(-2; 0; 1)$, $B(1; 2; -1)$ و $C(-2; 2; 2)$

(1) بين أن النقط A , B و C ليست في استقامة، ثم جد معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

(2) ليكن (P) و (P') المستويين اللذين معادلتاهما على الترتيب: $x + y - 3z + 3 = 0$ و $x - 2y + 6z = 0$

- بين أن المستويين (P) و (P') يتقاطعان وفق مستقيم (D) تمثيله الوسيطى: $(t \in \mathbb{R})$:
$$\begin{cases} x = -2 \\ y = -1 + 3t \\ z = t \end{cases}$$

(3) أثبت أن المستقيم (D) و المستوي (ABC) متقاطعان و عين إحداثيات نقطة تقاطعها.

(4) لتكن (S) سطح الكرة التي مركزها النقطة $\Omega(1; -3; 1)$ و نصف قطرها $r = 3$.

أ- أكتب معادلة ديكارتية لسطح الكرة (S) .

ب- ادرس تقاطع سطح الكرة (S) و المستقيم (D) .

ج- أثبت أن المستوي (ABC) مماس لسطح الكرة (S) .

التمرين الثاني: (4,5 نقاط)

1. حل في \mathbb{C} المعادلة: $z^2 - 6z + 13 = 0$.

2. المستوي المركب مزود بمعلم متعامد و متجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$. و نعتبر النقط A , B و C

صور الأعداد المركبة $z_1 = 3 - 2i$, $z_2 = 3 + 2i$ و $z_3 = 4i$ على الترتيب.

(أ) علم النقط A , B و C .

(ب) برهن أن الرباعي $OABC$ متوازي أضلاع.

(ت) عين لاحقة النقطة w مركز الرباعي $OABC$.

(ث) عين و أنشئ مجموعة النقط التي تحقق: $\|\vec{MO} + \vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}\| = 8$.

3. نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة العدديان المركبان $z_1 = \sqrt{2}(1 - i)$ و $z_2 = -i$.

(أ) أكتب \bar{z}_1 و \bar{z}_2 على الشكل الأسى.

(ب) لتكن M و M' نقطتان من المستوي المركب لاحتقانهما z و z' على الترتيب.

- عين طبيعة و عناصر التحويل التقطلي f الذي يرفق بكل نقطة M النقطة M' حيث:

$$f(M) = M': z' = z_1 \times z + (1 - z_1)z_2$$

التمرين الثالث: (4,5 نقاط)

$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + 3 \end{cases} \quad \text{نعتبر المتتالية العددية } (u_n) \text{ المعرفة على } \mathbb{N} \text{ بـ:}$$

i. مثل في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ المنحنى (C_r) الممثل للدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = \frac{1}{4}x + 3$ و المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$.

ii. مثل على محور الفواصل الحدود u_0, u_1, u_2 باستعمال التمثيل البياني (C_r) دون حساب الحدود.

iii. 1- برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي $n: u_n > 4$.

2- استنتج اتجاه تغيرات المتتالية (u_n) .

3- بين أن (u_n) متقاربة و عين نهايتها.

iv. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = \ln(u_n - 4)$.

1- برهن أن (v_n) متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها r وحدها الأول v_0 .

2- بين أن: $v_n = (1 - 2n)\ln(2)$.

3- استنتج عبارة u_n بدلالة n .

4- عين قيم العدد الطبيعي n حتى يكون: $u_n > 4 + 2 \cdot 10^{-4}$.

التمرين الرابع: (07 نقاط)

نعتبر الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = 1 + e^x - xe^x$ و تمثيلها البياني (C_r) في معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$

i. 1- علما أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ برهن أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$.

2- أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. فسّر هندسيا هذه النتيجة.

3- بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

4- بين أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]-\infty, 0]$ و متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$.

5- شكل جدول تغيرات الدالة f .

ii. 1- بين أن المنحنى (C_r) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $1 < \alpha < \frac{3}{2}$.

7- أدرس الوضعية النسبية للمستقيم (D) ذو المعادلة $y = x$ و المنحنى (C_r) على \mathbb{R} .

8- أنشئ المنحنى (C_r) و المستقيم (D) .

iii. 1- تحقق أن الدالة f المعرفة على \mathbb{R} بـ: $F(x) = x + (2-x)e^x$ دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R} .

2- استنتج الدالة الأصلية للدالة f حيث $F(0) = 2$.

مع تمنياتي لكم بالنجاح في البكالوريا

iv. 1- دالة عددية معرفة على $[1; +\infty[$ كما يلي: $h(x) = 1 + x - x \ln x$.

1- تحقق أن: $h = f \circ \ln$.

2- استنتج اتجاه تغير الدالة h على المجال $[1; +\infty[$.