

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04.5 نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة: (1) $z^2 + 2 \sin(2\theta)z + 4\sin^2\theta = 0 \dots$

1. حل في \mathbb{C} المعادلة (1) ثم أكتب الحلين على الشكل المثلثي. مع $\theta \in [0; \pi]$

2. عين في حالة $\theta = \frac{\pi}{4}$ الحلين Z_1 و Z_2 حيث Z_1 جزؤه التخيلي موجب.

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس نعتبر النقط A ، B و C والتي لواحقها على الترتيب:

$$Z_C = -Z_A \text{ و } Z_B = -1 - i , Z_A = -1 + i$$

1- عين مجموعة النقط M ذات اللاحقة Z بحيث: $\arg\left(\frac{Z-Z_C}{Z_A-Z_C}\right) = -\frac{\pi}{2}$

2- عين العددين الحقيقيين a و b بحيث تكون $G(1; 1)$ مرجح الجملة: $\{(A; a), (B; b), (C; 1)\}$

3- عين مجموعة النقط $M(x; y)$ ذات اللاحقة Z حيث: $Z - Z_G = \sqrt{2}e^{i\theta}$ مع $\theta \in \mathbb{R}$

4- عين طبيعة التحويل (T) الذي مركزه G و يحول A إلى B ، وما هي عناصره المميزة.

5- عين صورة (\vec{E}) صورة (E) بالتحويل (T) . يطلب تعيين عناصرها المميزة.

التمرين الثاني : (04 نقاط)

في الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. نعتبر النقط : $A(-2; 0; 1)$ ، $B(1; 2; -1)$ و $C(-2; 2; 2)$

1. أ) أحسب الجداء السلمي $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ثم عين الطولين AB و AC

ب) عين قياسا للزاوية الموجهة $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$ بالدرجة، ثم استنتج أن A ، B و C ليست في استقامة.

2. تحقق أن المعادلة الديكارتية للمستوي (ABC) هي: $2x - y + 2z + 2 = 0$

3. (p) و (\tilde{p}) مستويين في الفضاء معرفين ب معادلتيهما على الترتيب: $x + y - 3z + 3 = 0$ و $x - 2y + 6z = 0$

- بين أن المستقيم (Δ) المعرف بتمثيله الوسيط $\begin{cases} x = -2 \\ y = 3t - 1 \\ z = t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ هو تقاطع (p) و (\tilde{p}) .

- استنتج أن المستويات (p) ، (\tilde{p}) و (ABC) تشترك في نقطة واحدة يطلب تعيين إحداثياتها.


4. - بين أن مجموعة النقط $M(x; y; z)$ من الفضاء حيث:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 2z + 2 - m^2 = 0$$

هي سطح كرة يطلب تعيين مركزها وطول نصف قطرها. حيث m عدد حقيقي.

عين قيمة m في الحالتين: أ/ المستوي (ABC) يمس سطح الكرة (S) .

ب/ المستقيم (Δ) يقطع سطح الكرة (S) في نقطتين متميزتين .



التمرين الثالث: (04 نقاط)

f دالة معرفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = \ln(x^2 + 4)$

1. نعتبر الدالة g المعرفة على $[0; +\infty[$ بـ: $g(x) = f(x) - x$

1. أدرس تغيرات الدالة f ثم استنتج اتجاه تغير الدالة g

2. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $\alpha \in [2; 3]$

واستنتج أن α هو الحل الوحيد للمعادلة $f(x) = x$

II. نعتبر المتتالية (U_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ: $U_0 = 1$ و $U_{n+1} = f(U_n)$

(φ) هو المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد و متجانس، (Δ) المستقيم الذي معادلته: $y = x$.

1. أعد الرسم، ثم مثل الحدود U_0 ، U_1 ، U_2 و U_3 على محور الفواصل.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل عدد طبيعي n فإن: $1 \leq U_n \leq \alpha$

3. بين أن المتتالية (U_n) متقاربة ثم أحسب نهايتها.

التمرين الرابع: (07.5 نقاط)

1. f دالة عددية معرفة على \mathbb{R} كما يلي: $f(x) = e^{2x} - e^x + 1 - x$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2cm$

1. أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

2. أ- بين أن (C_f) يقبل خط مقارب مائل (Δ) بجوار $-\infty$ ، يطلب تعيين معادلته له.

ب- أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) .

3. أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ وأعط تفسيرا هندسيا للنتيجة.

4. أدرس تغيرات الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

5. أوجد معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) الموازي لـ (Δ) .

6. بين أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثياتها.

7. أرسم (T) ، (Δ) و (C_f) .

8. ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد و إشارة حلول المعادلة: $e^{2x} - e^x = m - 1$.

9. n عدد طبيعي غير معدوم، حيث $A(n)$ هي مساحة الحيز من المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) و

المستقيمات التي معادلاتها: $x = \ln m$ ، $x = \ln(n+1)$ و $y = -x + 1$

أ- بين أن: $A(n) = (4n - 2)cm^2$

ب- نضع $U_n = A(1) + A(2) + \dots + A(n)$ ، - أكتب U_n بدلالة n .

II. نسحب في آن واحد كرتين من كيس يحتوي على 4 كريات مرقمة بالعدد $A(1)$ ، و 3 كريات مرقمة

بالعدد $A(2)$ و 5 كريات مرقمة بالعدد $A(3)$ ، و نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة

لكرتين عدد مرات ظهور العدد $A(3)$

- أكتب قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب $E(X)$.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

أ- حل في \mathbb{C} المعادلة (E) : $(z + \sqrt{3} - 1)(z^2 - 2z + 4) = 0$

ب- في المستوي المركب المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ نعتبر النقط A ، B و C

والتي لواحقها على الترتيب: $Z_A = 1 - \sqrt{3}$ ، $Z_B = 1 + i\sqrt{3}$ و $Z_C = 1 - i\sqrt{3}$.

- 1- أكتب كلا من Z_A ، Z_B و Z_C على الشكل الأسي ، ثم بين أن: $Z_B^{2016} + Z_C^{2016} = 2^{2017}$.
 - 2- بين أن من أجل $n \in \mathbb{N}$ فإن: $Z_B^n + Z_C^n = 2^n$ عدد حقيقي، ثم عين قيم n بحيث: $Z_B^n + Z_C^n = 2^n$.
 - 3- أعط تفسيراً هندسياً لطويلة و عمدة العدد المركب: $\frac{Z_A - Z_C}{Z_A - Z_B}$ ، ثم استنتج طبيعة المثلث ABC .
 - 4- عين اللاحقة Z_G للنقطة G منتصف القطعة $[BC]$ ، ثم احسب الطولين GA و BC .
 - 5- نسمي (S) مجموعة النقط M ذات اللاحقة Z و التي تحقق: (1) $BM^2 + CM^2 = 12$ (2) $\vec{BM} \cdot \vec{CM} = 0$
- تحقق أنه من أجل كل نقطة M من المستوي : (1) تكافئ : (2) $\vec{BM} \cdot \vec{CM} = 0$
- بين أن A تنتمي للمجموعة (S) ، ثم حدد طبيعة المجموعة (S) مع تحديد عناصرها المميزة.
- علم بدقة النقط A ، B ، C و G ثم أنشئ (S) .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(A; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$ نعتبر متوازي المستطيلات القائم المعروف بـ :

$$\vec{AB} = 2\vec{i} , \vec{AD} = 6\vec{j} , \vec{AE} = 4\vec{k}$$

النقط I ، J ، K هي منتصفات القطع: $[EF]$ ، $[FB]$ ، $[AD]$ على الترتيب.

1. جد إحداثيات النقط B ، D ، F و E ثم تحقق حسابياً أن إحداثيات النقط I ، J ، K هي

$$(1; 0; 4) , (2; 0; 2) , (0; 3; 0)$$
 على الترتيب.

2. (P_1) المستوي الذي معادلته: $y = 0$ و (P_2)

$$2x + z = 6$$

- بين أن تقاطع (P_1) و (P_2) هو المستقيم (IJK)

3. أثبت أن الشعاع $\vec{n}(2; 2; 1)$ هو شعاع ناظمي


للمستوي (IJK) ، ثم عين معادلة ديكرتية له.

4. نعتبر سطح الكرة (S) ذو المركز F و طول نصف

القطر 1.

أ- أحسب المسافة بين النقطة F و المستوي (IJK)

ب- استنتج أن (S) يقطع (IJK) في دائرة (C) يطلب تعيين مركزها ω و طول نصف قطرها r .



التمرين الثالث: (04.5 نقاط)

نعتبر المتتالية (U_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $U_n = e^{2n} - e^{2(n-1)}$

1. أ- بين أن (U_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها و حدها الأول U_0

ب- أكتب بدلالة n ، S_n حيث : $S_n = U_0 + U_1 + \dots + U_n$

ج- استنتج المجموع S'_n حيث : $S'_n = S_0 + S_1 + \dots + S_n$

2. لتكن المتتالية (V_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $V_n = \sqrt{S_n + e^{-2}}$

أ- أكتب V_n بدلالة n .

ب- أحسب بدلالة n ، المجموع A_n حيث : $A_n = \frac{1}{V_0^3} + \frac{1}{V_1^3} + \dots + \frac{1}{V_n^3}$

ج- أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n$

3. لتكن المتتالية (W_n) المعرفة على \mathbb{N} بـ : $W_n = \ln(V_n)$

أ- بين أن المتتالية (W_n) متتالية حسابية ثم أحسب B_n حيث : $B_n = W_0 + W_1 + \dots + W_n$

ب- استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $V_0 \times V_1 \times \dots \times V_n = \sqrt{e^{n^2+n}}$

التمرين الرابع: (07.5 نقاط)

1. لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $g(x) = \frac{1}{x} - 1 - 2\ln x$

1. أدرس تغيرات الدالة g .

2. أحسب $g(1)$ ثم استنتج إشارة $g(x)$ على المجال $]0; +\infty[$.

II. لتكن الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $\begin{cases} f(x) = x - x^2 \ln x & ; x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$ و

ليكن (C) تمثيلها البياني في مستو منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ ، $\|\vec{i}\| = 3cm$ ،

1. أ- بين أن الدالة f مستمرة على يمين العدد 0 .

ب- أحسب $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ ، فسر النتيجة جبريا و هندسيا .

ج- أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم بين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ و فسر النتيجة هندسيا .

2. بين أنه من أجل كل $x \in]0; +\infty[$ فإن : $f'(x) = x \cdot g(x)$ ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة f .

3. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا على الأقل α حيث : $0 \leq \alpha \leq 2$

4. أنشئ (C) . (نضع $\alpha = 1.7$)

5. أ- باستعمال المكاملة بالتجزئة ، أحسب : $I(\alpha) = 9 \int_1^\alpha (x - f(x)) dx$. فسر العدد $I(\alpha)$ هندسيا .

ب- تحقق أن : $I(\alpha) = (-\alpha^3 + 3\alpha^2 + 1)cm^2$

6. لتكن الدالة h المعرفة على \mathbb{R} بـ : $h(x) = |x| - x^2 \ln|x|$ ($x \neq 0$) مع $h(0) = 0$

ت- بين أن الدالة h دالة زوجية .

ث- أنشئ (C_h) منحنى الدالة h انطلاقا من المنحنى (C) في نفس المعلم السابق .

III. نسحب في آن واحد كرتين من كيس يحتوي على 4 كريات مرقمة بالعدد $I(0)$ ، و 3 كريات مرقمة

بالعدد $I(1)$ و 5 كريات مرقمة بالعدد $I(2)$ ، و نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل سحبة

لكرتين عدد مرات ظهور العدد $I(0)$

- أكتب قانون احتمال المتغير العشوائي X ثم أحسب $E(X)$.